



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

---

---

# КУКУРУДЗА. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ-4525:2006

ІЗ ЗМІНАМИ ЗГІДНО НАКАЗУ Держспоживстандарту

ЗМІНА № 1 - №326 від 12.09.2009

Київ  
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ  
2009

## ПЕРЕДМОВА

- 1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Київський інститут хлібопродуктів»; Інститут зернового господарства УААН; Український інститут експертизи сортів рослин; Черкаська обласна державна хлібна інспекція  
РОЗРОБНИКИ: Г. Гуменюк, д-р с.-г. наук; В. Бурцев, канд. біол. наук; Є. Лебідь, д-р с.-г. наук; М. Кирпа, канд. с.-г. наук; О. Гончар, канд. с.-г. наук; А. Іваницька; З. Кубів
- 2 ПРИЙЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 лютого 2006 р. №54
- 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 13634-90)

**Право власності на цей документ належить державі.**

**Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України**

## **ЗМІСТ**

- 1 Сфера застосування
- 2 Нормативні посилання
- 3 Терміни та визначення понять
- 4 Типи
- 5 Загальні технічні вимоги
- 6 Вимоги безпеки і охорони довкілля
- 7 Правила приймання
- 8 Методи контролювання
- 9 Транспортування і зберігання
- 10 Гарантії постачальника

Додаток А Перелік основних сортів і гібридів кукурудзи, що характеризують тип

Додаток Б Максимально допустимий вміст шкідливих речовин у зерні кукурудзи

Додаток В Бібліографія

**ДСТУ 4525:2006**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ**

---

---

**КУКУРУДЗА**

**Технічні умови**

**КУКУРУЗА**

**Технические условия**

**CORN**

**Specifications**

---

**Чинний від 2007-04-01**

**1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ**

Цей стандарт поширюється на кукурудзу в зерні і качанах, призначену для використування на продовольчі та непродовольчі потреби і для експортування.

Розподілення кукурудзи на типи подано у таблиці 1; показники, характеристики та норми якості кукурудзи — у таблиці 2; обов'язкові вимоги до зерна кукурудзи, що гарантують безпеку життя і здоров'я людини, тварин та довкілля — у 5.2 (стан, запах, колір зерна, зараженість шкідниками), у 6.1 (токсичні елементи, мікотоксини і пестициди), у 6.2 (вимоги безпеки і виробничої санітарії), у 6.3 та 6.4 (охорона довкілля).

**2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ**

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2422-94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення

ДСТУ 3355-96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В<sub>1</sub> та суми афлатоксинів В<sub>1</sub> В<sub>2</sub>, G<sub>1</sub>, та G<sub>2</sub> у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці (EN 12955:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 15141-1-2001 Продукти харчові. Визначення охратоксину А у зерні та продуктах із зернових культур. Частина 1. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищанням силікагелем

**ДСТУ EN ISO 15141-2-2001 Продукти харчові. Визначення охратоксину у зерні та продуктах із зернових культур. Частина 2. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищанням бікарбонатом**

**ЗМІНА1 ДСТУ-4117-2002 Зерно і продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії**

*(ДСТУ-П-4117-2002 Зерно і продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії – вилучено згідно зміни 1)*

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охрана природы. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 10940-64 Зерно. Методы определения типового состава (Зерно. Методи визначення типового складу)

ГОСТ 10967-90 Зерно. Методы определения запаха и цвета (Зерно. Методи визначення запаху і кольору)

ГОСТ 11225-76 Зерно. Метод определения выхода зерна из початков кукурузы (Зерно. Метод визначення виходу зерна із качанів қукурудзи)

**ЗМІНА1 ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості**

*(ГОСТ 12038 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (Насіння сільськогосп. культур. Методи визначення схожості – вилучено згідно зміни 1))*

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначення залишкової кількості пестицидів)

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб (Зерно. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями (Зерно. Методи визначення зараженості і пошкоджуваності шкідниками)

ГОСТ 13586.5-93 Зерно. Метод определения влажности (Зерно. Методи визначення вологості)

ГОСТ 26927-86 Сыре и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначення ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сыре и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сыре и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення миш'яку)

ГОСТ26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначення міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначення свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначення кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка (Сировина і продукти харчові. Методи визначення цинку)

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно для кормовых потреб, продукти його переробляння, комбікорми. Методи визначення мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) і охратоксинуА)

ГОСТ 28396-89 Зерновое сырье, комбикорма. Методы определения патулина (Зернова сировина, комбікорми. Методи визначення патуліну)

ГОСТ 28419-97 Зерно. Метод определения сорной и зерновой примесей на анализаторе засоренности У1-ЕАЗ-М (Зерно. Метод визначення смітної і зернової домішок на аналізаторі засміченості У1-ЕАЗ-М)

ГОСТ 28666.1-90 (ИСО 6639/1-86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 1. Общие положения (Зернові і бобові. Визначення прихованої зараженості комахами. Частина 1. Загальні положення)

ГОСТ 28666.2-90 (ИСО 6639/2-86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 2. Отбор проб (Зернові і бобові. Визначення прихованої зараженості комахами. Частина 2. Відбирання проб)

ГОСТ 28666.3-90 (ИСО 6639/3-86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 3. Контрольный метод (Зернові і бобові. Визначення прихованої зараженості комахами. Частина 3. Контрольний метод)

ГОСТ 28666.4-90 (ИСО 6639/4-86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 4. Ускоренные методы (Зернові і бобові. Визначення прихованої зараженості комахами. Частина 4. Прискорені методи)

ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80) Кукуруза. Метод определения влажности (измельченных и целых зерен) (Кукурудза. Метод визначення вологості (подрібнених і цілих зерен)

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси (Зерно. Методи

визначення загального і фракційного вмісту смітної і зернової домішок; вмісту дрібних зерен і крупності; вмісту зерен пшениці, пошкоджених клопом-черепашкою; вмісту металомагнітної домішки).

### **3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ**

У цьому стандарті використано терміни та відповідні їм визначення понять згідно з ДСТУ 2422 та чинними в Україні документами:

#### **зерновий склад**

Юридична особа, яка на праві власності має зерносховище(-а) і сертифікат на відповідність послуг зі зберігання зерна та продуктів його перероблення

#### **зернова домішка**

Неповноцінні зерна кукурудзи та інших культурних рослин, що їх за стандартами віднесено до зернової домішки

**крупність зерна кукурудзи** — це відношення маси зерен кукурудзи в залишку на ситі з вічками діаметром 8 мм до маси основного зерна, виражене у відсотках.

#### **3.1 Засміченість зерна**

Домішки органічного й неорганічного походження, що підлягають видаленню із зерна кукурудзи у разі його використування за цільовою призначеністю. Домішки поділяють на зернову і смітну.

##### **3.1.1 До зернової домішки кукурудзи відносять:**

###### **3.1.1.1 бите зерно**

Частки зерна, утворені внаслідок механічної дії

###### **3.1.1.2 щупле зерно**

Зерно ненаповнене, зморщене, легковаге, здеформоване внаслідок несприятливих умов розвитку і визрівання

###### **3.1.1.3 давлене зерно**

Зерно здеформоване, сплющене внаслідок механічної дії

###### **3.1.1.4 проросле зерно**

**ЗМІНА1. Зерно із корінцем і (або) ростком, що вийшли за межі оболонки, або зерно із втраченим корінцем і ростком, але здеформоване, з явно зміненим кольором оболонки внаслідок проростання**

*(Зерно із корінцем або ростком, що вийшли за межі оболонки, або з ростком, який розірвав, але не вийшов на поверхню оболонки, та зерно із втраченим корінцем і ростком-*

*(вилучено згідно зміни I)*

### **3.1.1.5 пошкоджене морозом зерно**

**ЗМІНА1.** Зерно, пошкоджене заморозками у період дозрівання — свіжозібране до термічного сушіння зі зміненим кольором оболонки (білувате або потемніле) та сіруватим зародком. Після термічного сушіння зародок такого зерна набуває коричневого кольору і його відносять до домішки «пошкоджене зерно»

*(Морозобійне зерно Зерно, пошкоджене заморозками під час визрівання, зі зміненим кольором (білувате або потемніле) вилучено згідно зміни I)*

### **3.1.1.6 пошкоджене зерно**

**ЗМІНА1.** Цілі і биті зерна кукурудзи зі зміненим кольором оболонок, з ендоспермом від кремового до світло-коричневого кольору, а також з нормальним, ендоспермом, але з потемнілим зародком від світло-коричневого до чорного кольору, без видимого нальоту пліснявих грибів на поверхні або під оболонкою в зоні зародка внаслідок пошкодженості морозом, самозігрівання, сушіння та ураження хворобами

*(Зерно зі зміненим від кремового до світло-коричневого кольором оболонки та ендосперму внаслідок самозігрівання, висушення та ураження хворобами вилучено згідно зміни I)*

### **3.1.1.7 поїдене зерно**

Зерно, поїдене шкідниками незалежно від ступеня його пошкодження

### **3.1.1.8 недозріле зерно**

Зерно, що не досягло повної зрілості; із зеленуватим відтінком, легко деформується у разі натиснення.

## **3.1.2 До смітної домішки кукурудзи відносять:**

### **3.1.2.1 мінеральну домішку**

Обмежено допустима домішка мінерального походження (пісок, грудочки землі, галька тощо)

### **3.1.2.2 органічну домішку**

Домішки рослинного походження (частинки стеблин, листків, стрижнів, обгортки качанів, плівки тощо), рештки шкідників зерна, насіння дикорослих неотруйних рослин

### **3.1.2.3 шкідливу домішку**

Домішки рослинного походження, шкідливі для здоров'я людини і тварин

### **3.1.2.4 зіпсоване зерно**

**ЗМІНА1** Цілі і биті зерна кукурудзи з явно зіпсованим ендоспермом від коричневого до чорного кольору; з крихкою консистенцією ендосперму, запліснявілі — за наявністю видимого нальоту пліснявих грибів на поверхні зерна і (або) в зоні зародка під оболонкою

*(Зерно з явно зіпсованим ендоспермом від коричневого до чорного кольору та зерно зі світлим ендоспермом, що внаслідок незначного надавлювання розсипається. вилучено згідно зміни 1)*

### **3.2 Склад основного зерна, зернової і смітної домішок**

#### **3.2.1 До основного зерна кукурудзи відносять:**

- цілі та пошкоджені зерна кукурудзи, що за характером пошкоджень не віднесені до зернової і смітної домішок;
- биті зерна кукурудзи, які залишилися на ситі з вічками діаметром 4,5 мм (3,5 мм для мілкозерної кукурудзи розлусного типу — рисової та перлової);
- **ЗМІНА1 у кукурудзі, що її постачають на кормові потреби**
- **зерна зернових та зернобобових культур, які не віднесено, згідно зі стандартами на ці культури, за характером пошкоджень до зернової і смітної домішок**

*(у кукурудзі, що її постачають на кормові потреби — зерна і насіння інших культурних рослин, які не віднесено, згідно зі стандартами на ці культури, за характером їхніх пошкоджень до зернової і смітної домішок. . вилучено згідно зміни 1)*

#### **3.2.2 До зернової домішки кукурудзи відносять:**

- биті зерна кукурудзи, які пройшли крізь сито з вічками діаметром 4,5 мм (3,5 мм для мілкозерної кукурудзи розлусного типу — рисової та перлової) і залишилися на ситі з вічками розміром 1,2 мм x20 мм;
- поїдені зерна;
- давлені зерна;
- щуплі — цілі зерна кукурудзи, що пройшли крізь сито з вічками діаметром 4,5 мм (3,5 мм для мілкозерної кукурудзи розлусного типу — рисової та перлової) і залишилися на ситі з вічками розміром 1,2 мм x20 мм;
- пророслі зерна;
- **ЗМІНА1 недозрілі зерна;** *(недостиглі зерна вилучено згідно зміни 1);*
- морозобійні зерна;
- пошкоджені зерна;
- **ЗМІНА1 У кукурудзі, яку використовують на кормові потреби — зерна зернових та зернобобових культур, які віднесено, згідно зі стандартами на ці культури, за характером пошкодження до зернової домішки**

*(у кукурудзі, яку використовують на кормові потреби — цілі і биті зерна та насіння інших культурних рослин, які не віднесено, згідно зі стандарт. на ці культури, за характером пошкодж. до смітної домішки. вилучено згідно зміни 1);*

### **3.2.3 До смітної домішки кукурудзи відносять:**

- прохід крізь сито із полотна решітного з розміром вічок 1,2 мм х 20 мм;
  - **ЗМІНА1 у залишку на ситі з вічками діаметром 4,5 мм і на ситі з розміром вічок 1,2 мм х 20 мм: мінеральну та органічну домішки**  
*(у залишку на ситі з розміром вічок 1,2 мм х 20 мм: мінеральну та органічну домішки вилучено згідно зміни 1);*
  - насіння дикорослих рослин;
  - зіпсовані зерна кукурудзи;
  - шкідливу домішку — ріжки, сажку **ЗМІНА1 вражені нематодою зерна**, гірчак повзучий, термопсис ланцетний, в'язіль різникольоровий, геліотроп опушенооплідний, триходесму сиву;
  - у кукурудзі для продовольчих потреб та виробництва крохмалю і патоки — різні зерна та насіння інших культурних рослин;
  - у кукурудзі на кормові потреби — зерна і насіння інших культурних рослин, які віднесено згідно зі стандартами на ці культури, за характером їх пошкоджень до смітної домішки, а також насіння олійних культур, **ЗМІНА1 насіння рицини.**
- 

## **4 ТИПИ**

**4.1** Кукурудзу за ботанічними і біологічними ознаками, кольором та формою зерна поділяють на типи, які наведено в таблиці 1.

**Таблиця 1 — Розподілення кукурудзи на типи**

<b>Тип</b>	<b>Колір і форма зерна</b>	<b>Кукурудза інших типів</b>
I Зубоподібна жовта	Жовта, оранжева, жовта з білою верхівкою. Переважно продовгувата зі скошеними боками і вдавленою верхівкою зерна	15,0, в тому числі білої не більше ніж 5,0
II Зубоподібна біла	Біла, палева, блідо-рожева. Переважно продовгувата зі скошеними боками і вдавленою верхівкою зерна	15,0, в тому числі жовтої не більше ніж 2,0
III Кремениста жовта	Жовта, оранжева з білою верхівкою. Верхівка зерна округла без вдавлення. Зерно блискуче	15,0, в тому числі білої не більше ніж 5,0
IV Кремениста біла	Біла, палева, блідо-рожева. Верхівка зерна округла без вдавлення. Зерно блискуче	15,0, в тому числі жовтої не більше ніж 2,0
V Напівзубоподібна жовта	Жовта, оранжева. Форма перехідна від зубоподібної до кременистої із слабковдавленою верхівкою зерна або без вдавлення	25,0, в тому числі білої не більше ніж 5,0
VI Напівзубоподібна біла	Біла, палева, блідо-рожева. Форма перехідна від зубоподібної до кременистої із слабко вдавленою верхівкою зерна або без вдавлення	25,0, в тому числі жовтої не більше ніж 2,0
VII Розлусна жовта	Жовта. Продовгувата із дзьобоподібною або округлою верхівкою. Зерно гладке	15,0, в тому числі білої не більше ніж 5,0
VIII Розлусна біла	Біла. Продовгувата із дзьобоподібною або округлою верхівкою. Зерно гладке	15,0, в тому числі жовтої не більше ніж 2,0
IX Некласифікований	Кукурудза, яка не відповідає жодному з вищезазначених критеріїв (суміш типів)	

Примітка. Перелік основних сортів і гібридів, що характеризують тип, наведено у додатку А.

**4.2** Кукурудзу, яка містить домішки зерна кукурудзи іншого типу більше норми, вказаної у таблиці 1, визначають як «некласифікований» тип з поданням типового складу у відсотках.

## **5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

### **5.1 ЗМІНА1 Залежно від напрямів використання, кукурудзу поділяють на класи, дотримуючись вимог, наведених у таблиці 2**

(Залежно від використання кукурудзу розподіляють на 5 груп, дотримуючись вимог, наведених у таблиці 2. вилучено згідно зміни 1)

**Таблиця 2 — Вимоги до зерна кукурудзи**

Показник	Характеристика і норма для зерна кукурудзи (Характеристика і норма для зерна кукурудзи різних груп використання вилучено згідно зміни 1)				
	ЗМІНА1				
	2 клас	1 клас	2 клас	3 клас	
	Харчові концентрати і продукти	Продукти дитячого харчування	крупи, борошно	крохмаль і патока	кормові потреби
<b>Типовий склад</b>	I-VII типи				I - IX типи
<b>Вологість, %, не більше</b>	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Рядок вилучено згідно зміни 1 Зокрема після штучного сушіння, %, не менше	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
<b>Зернова домішка, %, не більше</b>	7,0	3,0	7,0	7,0	15,0
Зокрема:					
пророслі зерна	2,0	Не дозволено	2,0	У межах зернової домішки	5,0
пошкоджені зерна	1,0	Те саме	1,0	Те саме	У межах зернової домішки
Рядок вилучено згідно зміни 1 зерна і насіння інших культурних рослин, віднесені до зернової домішки	Не дозволено				2,0
<b>Смітна домішка, %, не</b>	1,0	1,0	2,0	3,0	5,0
Зокрема:					
зіпсовані зерна	0,5	Не	1,0	1,0	1,0
мінеральна домішка	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0
зокрема: галька, шлак, руда	0,1	0,1	0,1	У межах мінеральної домішки	
шкідлива домішка	0,2	Не	0,2	0,2	0,2
зокрема:					
сажка і ріжки	0,15	Те саме	0,15	0,15	0,15
гірчак повзучий і в'язель різникользоровий	0,1	Те саме	0,1	0,1	0,1
триходесма сива, геліотроп опушенооплідний і насіння рицини, Слово вилучено згідно зміни 1 - амброзія	Не дозволено				
<b>Крупність, %, не менше</b>	80,0	Не визначається Слово вилучено згідно зміни 1 Не обмежено			
для кукурудзи VII—VIII типів	Не визначається Слово вилучено згідно зміни 1 Не обмежено				
<b>Схожість, %, не менше</b>	Не визначається Слово вилучено згідно зміни 1 Не обмежено	55,	Не визначається Слово вилучено згідно зміни 1 Не обмежено	55,0	Не визначається Слово вилучено згідно зміни 1 Не обмежено
<b>Зараженість шкідниками</b>	Не дозволено		Не дозволено, крім зараженості кліщем не вище 1 ступеня		

**5.2** Кукурудза всіх **ЗМІНА1 класів** (згідно зміни 1) повинна бути у здоровому стані, не зіпріла та без теплового пошкодження під час сушіння; мати запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, солодового, пліснявого, інших сторонніх запахів); колір, властивий здоровому зерну відповідного типу.

**5.3** Кукурудзу заготовляють у зерні або качанах. Кукурудзу у качанах потрібно постачати на підприємства в очищенному від обгорток стані, вміст качанів з обгортками — не більше 2 %.

**5.4** За згодою зернових складів, інших суб'єктів підприємницької діяльності вологість зерна та вміст зернової, смітної домішок у кукурудзі допускають вище граничних норм за можливості доведення такого зерна до показників якості, зазначених у таблиці 2.

**5.5** Для переробляння на продовольчі і кормові потреби кукурудзу постачають тільки в зерні. **ЗМІНА1 Типовий склад кукурудзи згідно з ГОСТ 10940 узгоджують між споживачем-переробником і постачальником зерна на крупи, харчові концентрати, продукти, крохмаль і патоку**

(*Типовий склад кукурудзи узгоджують зі споживачем - переробником зерна на крупи, харчові концентрати, продукти, крохмаль і патоку згідно з ГОСТ 10940. вилучено згідно зміни 1*)

**5.6** Кукурудза, яку формують для експортування, повинна бути у здоровому стані, мати нормальній запах та колір, бути не зараженою шкідниками зерна Вимоги до якості кукурудзи за іншими показниками зазначають у контракті між постачальником і покупцем зерна.

## **6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ**

**6.1** Вміст токсичних елементів, мікотоксинів і пестицидів у кукурудзі, використованої для продовольчих та технічних потреб, а також для експортування, не повинен перевищувати допустимі рівні, визначені «Медико-біологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов», № 5061 [1], а для кормових потреб — допустимі рівні, встановлені Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 03.11.98 р. № 16 [3]. За радіологічними показниками зерно кукурудзи повинно відповідати вимогам **ЗМІНА1 ГН 6.6.1.1-130** (ДР-97 вилучено згідно зміни 1) [2]. Максимально допустимий вміст у кукурудзі шкідливих елементів і мікотоксинів наведено у додатку Б.

**6.2** Під час роботи із зерном кукурудзи потрібно дотримуватися вимог, викладених у «Правилах техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР» [4]

**6.3** Контрлювання за дотриманням норм викидів шкідливих речовин в атмосферу потрібно виконувати згідно з вимогами ГОСТ 17.2 3 02 і ДСП 201 [5].

**6.4** Охороняють ґрунт від забруднення побутовими і виробничими відходами відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [6]

## **7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ**

**7.1** Правила приймання — згідно з ГОСТ 13586.3.

**7.2** У кожній партії кукурудзи визначають стан зерна, запах, колір, типовий склад, вологість, зернову і смітну домішки, зараженість шкідниками, крупність та схожість ЗМІНА1 згідно з вимогами, наведеними в таблиці 2.

**7.3** Під час приймання кукурудзи в качанах якість і вихід зерна визначають за зерном, одержаним під час лабораторного обмолоту проби качанів, відібраної від партії.

**7.4** ЗМІНА1 Кукурудзу, в якій домішка зернових, зернобобових та олійних культур становить понад 15 % від загальної маси зерна разом з домішками, приймають як суміш кукурудзи з іншими культурами і зазначають її-склад у відсотках

(Кукурудзу, в якій домішка інших зернових та насіння зернобобових культур становить понад 15 % від загальної маси зерна, приймають як суміш кукурудзи з іншими культурами і зазначають її склад у відсотках. вилучено згідно зміни 1)

**7.5** Вміст і періодичність контролювання токсичних елементів, мікотоксинів і пестицидів та радіонуклідів у кукурудзі, використовуваної для продовольчих, технічних потреб і для експортування, виконують згідно з методичними рекомендаціями «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки» [7], а на кормові потреби — згідно із методичними рекомендаціями «Порядок і періодичність контролю комбікормів і комбікормової сировини за показниками безпеки» [8].

**7.6** Кожну партію кукурудзи супроводжують свідоцтвом про вміст пестицидів, токсичних елементів, мікотоксинів, радіонуклідів та посвідченням або сертифікатом про якість.

## **8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ**

**8.1** Відбирають проби згідно ГОСТ 13586.3 та ДСТУ 3355.

**8.2** Визначають типовий склад згідно з ГОСТ 10940.

**8.3** Визначають запах., колір і знебарвленість згідно з ГОСТ 10967.

**8.4** Визначають вологість згідно з ГОСТ 13586.5; ГОСТ 29305 (ІСО 6540); ДСТУ-(*П вилучено згідно зміни 1*)- 4117

**8.5** Визначають смітні, шкідливі і зернові домішки і крупність згідно з ГОСТ 30483, ГОСТ 28419

**8.6** Визначають схожість згідно з ЗМІНА1 ДСТУ 4138 (*ГОСТ 12038 вилучено згідно зміни 1*) із наступним доповненням

— із середньої проби зерна, відібраної згідно з ГОСТ 13586.3 за допомогою дільника або вручну, виділяють наважку зерна масою 400 г. Зерно наважки перемішують, розрівнюють тонким шаром у вигляді квадрата, який ділять по діагоналі на чотири трикутники і з двох протилежних трикутників, починаючи зверху, відраховують підряд по 100

цілих зерен, які не віднесені до зернової чи смітної ДОМІШОК, одержують дві проби по 100 зерен у кожній. Зерно, яке залишилось, знову перемішують і виділяють згідно з наведеним вище способом ще дві проби по 100 зерен кожна.

**8.7** Визначають зараженість шкідниками згідно з ГОСТ 13586.4; ГОСТ 28666.1 (ISO 6639/1-86); ГОСТ 28666.2 (ISO 6639/2-86); ГОСТ 28666.3 (ISO 6639/3-86); ГОСТ 28666.4 (ISO 6639/4-86).

Примітка. Стандарти ISO на методи контролювання якості використовують у разі, якщо це передбачено контрактом для експортування кукурудзи

**8.8** Визначення токсичних елементів

Готують проби до аналізування згідно з ГОСТ 26929, визначають ртуть згідно з ГОСТ 26927, миш'як — згідно з ГОСТ 26930, мідь — згідно з ГОСТ 26931, свинець — згідно з ГОСТ 26932, кадмій — згідно з ГОСТ 26933, цинк — згідно з ГОСТ 26934.

**8.9** Визначають пестициди у продовольчій кукурудзі згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [9], у кормовій — згідно з ГОСТ 13496.20.

**8.10** Визначають мікотоксини у **продовольчій кукурудзі** згідно з методами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я: афлатоксин В1 — згідно з МР № 2273-80 [10] або МУ № 4082-86 [11], ДСТУ EN 12955; зеараленон — згідно з МР № 2964-84 [12]; Т-2 токсин — згідно з МУ № 3184-84 [13]; дезоксиніваленол (вомітоксин) — згідно з МУ № 3940-85 [14] або № 5177-90 [15]; охратоксин А — згідно з ДСТУ EN ISO 15141-1 або ДСТУ EN ISO 15141-2; у **кормовій кукурудзі**: зеараленон і Т-2 токсин — згідно, з ГОСТ 28001; патулін — згідно з ГОСТ 28396; дезоксиніваленол (вомітоксин) — згідно з МУ № 3940-85 [14] або № 5177-90 [15]; афлатоксин В1 зеараленон і Т-2 токсин — за методами, затвердженими Міністерством сільського господарства України — № 15-14/23 [16] і патулін — № 15-14/22 [17] радіонукліди стронцію-90 і цезію-137 — згідно з МУ № 5778 [18] і № 5779 [19].

**8.11** Визначають вихід зерна із качанів кукурудзи згідно з ГОСТ 11225.

## **9 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ**

**9.1** Кукурудзу перевозять насипом транспортом усіх видів згідно правил перевезення вантажів, чинних для транспорту цього виду.

**9.2** Транспортні засоби повинні бути чисті, без сторонніх запахів. Під час навантажування, перевезення і розвантажування зерно кукурудзи повинно бути захищене від атмосферних опадів.

**9.3** Кукурудзу розміщують та зберігають у чистих, сухих, без сторонніх запахів, не заражених шкідниками зерна зерносховищах відповідно до санітарних правил і умов збереження, затверджених в установленому порядку в Україні.

## **10 ГАРАНТІЙ ПОСТАЧАЛЬНИКА**

Підприємство-постачальник гарантує відповідність кукурудзи вимогам цього стандарту у разі дотримання умов транспортування та зберігання.

**ДОДАТОК А**  
**(довідковий)**

**ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СОРТІВ І ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ, ЩО  
ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ТИП**

<b>Тип кукурудзи</b>		<b>Сорт, гібрид кукурудзи</b>
<b>I</b>	Зубоподібна жовта	Дніпровський 172 МВ, Дніпровський 193 МВ, Дніпровський 273 АМВ, Дніпровський 284 МВ, Дніпровський 337 МВ, Дніпровський 450 МВ, Дніпровський 473 СВ, Одеська 10, Одма 310 МВ, Одеський 297 МВ, Одеський 346 МВ, Одеський 508 МВ, Харківський 294 МВ, Харківський 311 МВ, Колективний 225 МВ, ТОСС 230 МВ, Борисфен 191 МВ, Борисфен 490 АМВ, Наддніпрянська 50
<b>II</b>	Зубоподібна біла	Внесених до Реєстру сортів рослин України немає
<b>III</b>	Кремниста жовта	Колективний 111 СВ, ТОСС 218 МВ
<b>IV</b>	Кремниста біла	Внесених до Реєстру сортів рослин України немає
<b>V</b>	Нагівзубоподібна жовта	Дніпровський 177 СВ, Дніпровський 203 МВ, Славутич 271 МВ, Дніпровський 310 МВ, Дніпровський 345 МВ, Платан МВ, Корсар МВ, Карат СВ, Харківський 199 МВ; Харківський 290 МВ, Харківський 315 МВ, ТОСС 156 МВ, Колективний 210 АСВ
<b>VI</b>	Нагівзубоподібна біла	Внесених до Реєстру сортів рослин України немає
<b>VII</b>	Розлусна жовта	Дніпровська 298, Дніпровський 925
<b>VIII</b>	Розпушна біла	Ерлікон
<b>IX</b>	Некласифікований	Суміш сортів і гібридів

**ДОДАТОК Б**  
**(обов'язковий)**

**МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМІЙ ВМІСТ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН  
У ЗЕРНІ КУКУРУДЗИ**

Показники	Зерно кукурудзи, використовуваної для	
	продовольчих і технічних потреб та експортuvання	кормових потреб
<b>Токсичні елементи, мг/кг:</b>		
свинець	0,5 (0,3 для дитячого харчування)	5,0
кадмій	0,1 (0,03 для дитячого харчування)	0,3
миш'як	0,2	0,5
ртуть	0,03	0,1
мідь	10,0	30,0
цинк	50,0	50,0
<b>Мікотоксини, мг/кг:</b>		
афлатоксин Ві	0,005	0,025—0,1
зеараленон	1,0	2—3
T-2 токсин	0,1	0,2
дезоксиніваленол (вомітоксин)	0,5—1,0	1—2
патулін	Не регламентовано	0,5
<b>Радіонукліди, Бк/кг:</b>		
стронцій-90	<b>20,0</b> (5,0 вилучено згідно зміни I)	100
цезій-137	<b>50,0</b> (20,0 вилучено згідно зміни I)	600
<b>Пестициди</b>	Перелік пестицидів, за якими контролюють зерно кукурудзи, залежить від використовування їх на визначеній території та узгоджується зі службами Міністерства охорони здоров'я і ветеринарної медицини України	

## ДОДАТОК В (додатковий)

### БІБЛІОГРАФІЯ

**1.** Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденные Министерством здравоохранения СССР 01.08.1989 г., № 5061

**2. ЗМІНА1 ГН 6.6.1.1-130-2006 Державні гігієнічні нормативи «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у продуктах харчування та питній воді, затверджені МОЗ України 03.05.2006 р., наказ № 256**

*(Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у продуктах харчування та питній воді (ДР-97), затверджені МОЗ України 19.08.97 р., № 255 вилучено згідно зміни 1)*

**3.** Обов'язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких вдається ветеринарне свідоцтво (Ф-2), затверджений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 03.11.98 р., №16

**4.** Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна Министерства хлебопродуктов СССР, утвержденные Министерством хлебопродуктов СССР 18.04.1988 г., № 99-88

**5.** ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров'я України 09.07.97 р., №201

**6.** СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания населенных мест

**7.** Методичні рекомендації МР 4.4.4-108-2004 «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджені Міністерством охорони здоров'я України 02.07.2004 р. № 329

**8.** Методичні рекомендації «Порядок і періодичність контролю комбікормів і комбікормової сировини за показниками безпеки», затверджені Міністерством агропромислового комплексу України 03.10.1997 р.

**9.** ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітря робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті, затверджені Міністерством охорони здоров'я України від 20.09.2001 р. № 137

**10.** Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах, № 2273-80, утвержденные Минздравом СССР 10.12.1980 г.

**11.** Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии, № 4082-86, утвержденные Минздравом СССР 20.03.1986 г.

**12.** Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания зеараленона в пищевых продуктах, № 2964-84, утвержденные Минздравом СССР 23.01.1984 г.

**13.** Методические указания по обнаружению, идентификации и определению Т-2 токсина в пищевых продуктах, № 3184-84, утвержденные Минздравом СССР 29.12.1984 г.

**14.** Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиваленола (вомитоксина) в зерне и зернопродуктах, № 3940-85, утвержденные Минздравом СССР 20.10.1985 г.

**15.** Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиваленона (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах, № 5177-90, утвержденные Минздравом СССР 01.06.1990 г.

**16.** Правила одночасного виявлення афлатоксину В<sub>1</sub>, патуліну, стеригматоцистину, Т-2 токсину та зеараленону в різних кормах, затверджені Міністерством сільського господарства і продовольства України 09.04.1996 р., № 15-14/23

**17.** Правила визначення мікотоксину патуліну в кормах і продуктах харчування, затверджені Міністерством сільського господарства і продовольства України 09.04.1996 р., № 15-14/22

**18.** Методические указания № 5778-91 «Определение в пищевых продуктах стронция-90», утвержденные Минздравом СССР 04.01.1991 г.

**19.** Методические указания № 5779-91 «Определение в пищевых продуктах цезия-137», утвержденные Минздравом СССР 04.01.1991 г.

---

УКНД: 67.060

**Ключові слова:** кукурудза для продовольчих потреб, кукурудза для кормових потреб, типи, вимоги, контролювання якості, приймання, транспортування, гарантії.

---

**ПОПРАВКИ,  
ВНЕСЕНІ В ПС № 3-2006**

(Підстава — наказ Держспоживстандарту України від 30.03.2007 р. № 70)

Mісце поправки	Надруковано	Повинно бути
Розділ «Затверджені національні стандарти України», с 9, рядок ДСТУ 4521:2006	Чинний від 01.01.2007	Чинний від 01.07.2007
С 10, рядки: ДСТУ 4522:2006 ДСТУ 4523:2006 ДСТУ 4524:2006 ДСТУ 4525:2006	Чинний від 01.01.2007 Чинний від 01.01.2007 Чинний від 01.01.2007 Чинний від 01.01.2007	Чинний від 01.07.2007 Чинний від 01.07.2007 Чинний від 01.07.2007 Чинний від 01.07.2007
с 12, рядок ДСТУ 4520:2006	Чинний від 01.01.2007	Чинний від 01.07.2007
С 12, розділ «Позначення затверджених національних стандартів України», рядки: ДСТУ 4520:2006 ДСТУ 4521:2006 ДСТУ 4522:2006 ДСТУ 4523:2006 ДСТУ 4524:2006 ДСТУ 4525:2006	01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.04.2007	01.07.2007 01.07.2007 01.07.2007 01.07.2007 01.07.2007 01.07.2007

**(ПС № 4-2007)**